

Brudzinského příznak



Existuje několik modifikací tohoto manévru, přičemž nejdůležitější je ta, při které **pacient leží na zádech** a provádíme **anteflexi šíje**. Pokud dojde k mimovolnému **pokrčení** původně natažených dolních končetin **v kolenou hodnotíme příznak jako pozitivní (Brudzinský I)**.^[1] ▶

Brudzinský I (video, Centrum elektronického vzdělávání 1.LF UK) (<https://el.lf1.cuni.cz/neuronorma/default/video/video49.html>)



Příznak Brudzinského

Jiné Brudzinského manévry jsou méně používány. Brudzinský věřil, že některé jeho příznaky mohou být pozitivní u jedné patologie, zatímco jiné příznaky pozitivní u druhé. Vzhledem k tomu, že Brudzinského příznak bývá pozitivní u meningitidy, kterou je nutno rychle léčit a tudíž i diagnostikovat, nezdržujeme se hledáním positivity všech příznaků.^[2]

Brudzinského příznak (Brudzinski I)

- **Brudzinský II** je pozitivní tehdy, pokud tlakem na jařmový oblouk vyvoláme bolestivou grimasu.^[3]
- **Brudzinský III** je pozitivní tehdy, pokud tlakem na symphysis ossis pubis vyvoláme flexi dolních končetin.^[3]
- **Brudzinský IV** je pozitivní tehdy, pokud při flexi jedné natažené končetiny v kyčli se flektuje i druhá.^[3]

Odkazy

Související články

- Meningeální jevy
- Meningeální syndrom

Externí odkazy

- Neurologické vyšetření - norma (<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>) (Centrum elektronického vzdělávání 1.LF UK)

Reference

1. ROTH, Jan, Ondřej FIALA a Evžen RŮŽIČKA. *Neurologické vyšetření - norma* [online]. [cit. 2012-11-22]. <<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>>.
2. VARGHESE, A a G GALLEMORE. *Kernig's and Brudzinski's signs revisited* [online]. [cit. 2012-11-22]. <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3321367>>.
3. -*Meningeální syndrom* [online]. [cit. 2012-11-28]. <<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>>.