

Chronická paroxysmální hemikránie

CPH je primární bolestí hlavy, která se vyskytuje častěji u žen a je charakterizována následujícími symptomy:

- **Alespoň 20 atak silné bolesti s frekvencí 5 atak za den** (nebo méně) lokalizované **unilaterálně v orbitě, supraorbitálně nebo temporálně** a trvající **2-30 min.**
- Spolu s bolestí hlavy se objeví **alespoň jedno z následujících**:
 - *Ipsilaterální konjunktivální injekce, slzení nebo oboje.*
 - *Ipsilaterální nasální kongesce, rhinorrhea nebo obojí.*
 - *Ipsilaterální otok víčka.*
 - *Ipsilaterální pocení na čele a tváři.*
 - *Ipsilaterální míoza, ptóza nebo obojí.*^[1]

V terapii je lékem volby **Indomethacin**, obvykle 75-150 mg/den ve více dávkách.^[1] Při nesnášenlivosti Indomethacinu je lékem druhé volby *kyselina acetylsalicylová* nebo *verapamil* pro profylaxi.^[2]

CPH může spontánně odeznít nebo přetrvávat celoživotně.^[1]

Odkazy

Související články

- Bolesti hlavy
- Trigeminální autonomní cephalalgie

Externí odkazy

- Chronic paroxysmal hemicrania (Medscape) (<https://emedicine.medscape.com/article/1142296-overview>)

Reference

1. BRUST, John C. M. *Current diagnosis and treatment, Neurology*. 2. vydání. Singapore : McGraw-Hill, 2012. ISBN 9780071326957.
2. MANISH, Singh K. *Chronic Paroxysmal Hemicrania Treatment & Management* [online]. Poslední revize 30.1.2012, [cit. 2013-01-18]. <<https://emedicine.medscape.com/article/1142296-treatment>>.