

Diferenciální diagnóza a terapie paréz u infekčních chorob

- V průběhu mnoha infekcí může dojít k obrnám různých svalových skupin.
- Parézy u infekčních chorob vznikají:
 - **V průběhu akutní fáze nemoci** – Dětská mozková obrna (DMO), coxsackie a ECHO viry.
 - **Nasedají na horečku** – klíšťová encefalitida, parainfekční encefalitidy.
 - **První příznak při afebrilii** – botulismus, polyradikuloneuritidy.
 - **V časně či pozdní rekonvalescenci** – záškrt.
- Někdy jde přímo o postižení motoriky (DMO, botulismus).
- Jindy o změny citlivosti (polyradikuloneuritida).
- *Prognóza závisí na typu postižených struktur a typu změn :*
 1. špatnou prognózu mají *bulbární a ascendentní formy*,
 2. trvalá poškození jsou při destrukci neuronů.

Odkazy

Související články

- Paréza

Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. [cit. 2009]. <<http://jirben.wz.cz>>.

Použitá literatura

- HAVLÍK, Jiří, et al. *Infektologie*. 2. vydání. Praha : Avicenum, 1990. 393 s. s. 59. ISBN 80-201-0062-8.