

# Israeliho hmat



Jedná se o bimanuální **palpaci** ledviny. Pacient leží na zádech s mírně pokrčenými dolními končetinami. Palpujeme v bederní krajině. Jednou rukou tlačíme zespodu ledvinu ventrálně směrem k druhé ruce zanořené do hloubky pár centimetrů pod žeberním obloukem. Normální ledvina **není hmatná**. Je pozitivní při hydronefróze, polycystóze, solitární cystě a nádoru ledviny.

V případě vyšetření dítěte, vyšetřujeme jednou rukou. Dítě je v poloze na boku s mírně pokrčenými koleny.

## Odkazy

### Související články

- Tapotement
- Vyšetření břicha

### Zdroj

- ZELENKOVÁ, Jitka, et al. *Pracovní text z Interní propedeutiky* [online]. [cit. 2014-01-14]. <<http://int-prop.lf2.cuni.cz/>>.
- KLENER, Pavel a Mojmír HORYNA. *Propedeutika ve vnitřním lékařství*. 2. vydání. Praha : Karolinum : Galén, 2006. ISBN 80-7262-429-6.
- KAWACIUK, Ivan. *Urologie*. 1. vydání. Praha : Galén, c2009. ISBN 978-80-7262-627-7.