

Klenba nožní

Klenba nožní je udržována vzájemným poměrem mediálního a laterálního sloupce nožních kostí, napětím svalů a vazů nohy a bérce. Rozlišujeme nožní klenbu příčnou a podélnou.

Příčná klenba nožní je dána vyklenutím ossa cuneiformia, udržují ji:

- mezikostní vazy:
 - ligg. intercuneiformia interossea,
 - lig. cuneonaviculare plantare,
 - lig. tarsometatarsea plantaria,
- m. fibularis longus (dříve m. peroneus longus - upíná se na os cuneiforme mediale a bazi 1. metatarzu zevně) – dříve uváděn i m. tibialis anterior,
- m. adductor hallucis.

Podélná klenba nožní, jejímž vrcholem je talus, je udržována:

- mezikostní vazy, lig. plantare longum,
- plantární aponeuróza,
- m. tibialis anterior (úpon na os cuneiforme mediale a bazi 1. metatarzu navnitř),
- m. tibialis posterior (úpon na os naviculare, ossa cuneiformia),
- m. flexor hallucis longus, m. flexor digitorum longus.

Odkazy

Související články

- Pes planovalgus
- Plantografie

Zdroj

- PASTOR, Jan. *Langenbeck's medical web page* [online]. [cit. 7. 4. 2009]. <<https://langenbeck.webs.com/>>.



Kostra nohy, pohled na mediální stranu.



Kostra nohy, pohled na laterální stranu.