

Odds ratio

Odds ratio (OR) je poměr šancí výskytu určité události v závislosti na události druhé (události A a B). Kvantifikuje tedy sílu vztahu mezi těmito dvěma veličinami. OR pracuje s dichotomickými proměnnými (nabývají dvou stavů) a nejčastěji se aplikuje ve studiích případů a kontrol.

Ojediněle se využívá i v kohortových studiích, kde je však nutno použít specifickou interpretaci získaných dat. [1]

Výpočet

$$Odds = \frac{P}{1 - P} = \frac{P_{jev\ se\ vyskytne}}{P_{jev\ se\ nevyskytne}}$$

Když P je počet daných případů.

Z toho potom odds ratio vypočítáme jako:

$$OR = \frac{odds_{priopady}}{odds_{kontroly}}$$

nebo vzorcem odvozeným z klasické čtyřpolní tabulky:

$$OR = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Příklad

Představme si, že máme celkem 200 účastníků určité studie, kteří byli rozděleni na dvě skupiny po 100 subjektech. První skupina byla léčena, druhá - kontrolní a léčena nebyla. Získaná data můžeme rozdělit do následující tabulky:

	Zemřelí	Živí	Celkový počet subjektů
Léčení	5	95	100
Kontrol	10	90	100

Zde by tedy šance, že účastník v léčené skupině zemře, byla 5/95, nebo 0,0526 (pravděpodobnost smrti v léčené skupině je 5/100 a pravděpodobnost života je 95/100), zatímco šance, že zemře účastník v kontrolní skupině, byla 10/90 nebo 0,1111. Výsledný poměr šancí by pak byl 0,0526/0,1111 nebo 0,4737.

Kromě OR je možné na základě této tabulky spočítat i relativní riziko (RR) a rozdíl rizika (*risk difference*).

Interpretace

Vyhodnocení odds ratio:

Hodnota OR	Vyhodnocení
OR = 1	žádný korelát mezi rizikovým faktorem a onemocněním (popř. žádná závislost mezi zkoumanými událostmi A a B – pravděpodobnost nastání jedné události je stejná nezávisle na přítomnosti či nepřítomnosti události druhé)
OR > 1	pozitivní asociální, negativní rizikový faktor (přítomnost jedné události navyšuje šanci na nastání události druhé)
OR < 1	pozitivní, protektivní faktor (přítomnost jedné události snižuje šanci na nastání události druhé)

Získané hodnoty OR se následně interpretují pomocí tzv. intervalů spolehlivosti (CI – z anglicky *confidence intervals*), přičemž se typicky využívají ty s 95% hodnotou. Čím je CI menší, tím je hodnota OR preciznější. Je nutné ale brát v potaz fakt, že CI (narození od p-hodnoty) nezdůrazňují statistickou signifikanci daných výsledků. [2][3]

Výpočet spodní a horní hranice 95%CI:

$$\text{Nelze pochopit (syntaktická chyba): } \text{Spodní 95\%CI} = e^{\ln(OR)} + 1.96 \sqrt{(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)}$$

$$\text{Nelze pochopit (syntaktická chyba): } \text{Horní 95\%CI} = e^{\ln(OR)} - 1.96 \sqrt{(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)}$$

Odkazy

Související články

- Atributivní riziko
- Absolutní riziko
- Relativní riziko
- Incidence
- Normální rozdělení
- Metaanalýza
- Čtyřpolní a kontingenční tabulka
- Konfidenční interval

Použitá literatura

- BENCKO, Vladimír, et al. *Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1.* LFUK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.
- GÖPFERTOVÁ, Dana, et al. *Epidemiologie: průvodce epidemiologickou metodou.* 1. vydání. Praha : nakladatelství TRITON, 1999. s. 55. ISBN 80-7254-037-8.
- BORENSTEIN, Michael. *Introduction to Meta-Analysis.* - vydání. Wiley, 2009. 421 s. ISBN 9780470057247.

Reference

1. BORENSTEIN, Michael. *Introduction to Meta-Analysis.* - vydání. Wiley, 2009. 421 s. ISBN 9780470057247.
2. SZUMILAS, Magdalena. Explaining odds ratios. *J Can Acad Child Adolesc Psychiatry* [online]. 2010, vol. 19, no. 3, s. 227-9, dostupné také z <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2938757/?tool=pubmed>>. ISSN 1719-8429 (print), 2293-6122.
3. JACKSON, Dan a Jack BOWDEN. Confidence intervals for the between-study variance in random-effects meta-analysis using generalised heterogeneity statistics: should we use unequal tails?. *BMC Medical Research Methodology.* 2016, roč. 1, vol. 16, s. ?, ISSN 1471-2288. DOI: 10.1186/s12874-016-0219-y (<http://dx.doi.org/10.1186%2Fs12874-016-0219-y>).