

Ossa metatarsi

Jsou lokalizovány na distální části hřbetu nohy a distální části chodidla. Navazují tedy na kosti zánártní (ossa tarsalia) a dále přecházejí v kosti článků prstů. Nártních kostí je celkem 5, označují se jako 1. až 5. kost nártní (os metatarsale I-V) a dohromady tvoří oblast zvanou nárt (lat. metatarsus).

Stavba nártních kostí

Každá kost se skládá ze tří částí:

1. **Basis (baze)** = širší proximální úsek kosti,
 - na proximální hraně je rovná ploška pro skloubení s danou kostí zánártní,
 - po stranách jsou plošky pro skloubení s vedlejšími kostmi nártními (u os metatarsale I nejsou konstantně).
2. **Corpus (tělo)** = střední protáhlý užší úsek kosti,
 - tělo os metatarsale I je mohutné,
 - těla u ossa metatarsalia II-V se distálně zužují a jsou štíhlá.
3. **Caput (hlavice)** = nasedá distálně na tělo kosti,
 - na bočních hranách je vklesnutá,
 - distálně má konvexní kloubní plochu.



Kosti nohy

Mezi jednotlivými kostmi nártu jsou spatia intermetatarsalia, jsou to čtyři prostory, ve kterých se nacházejí mm. interossei pedis.

Některé kosti mají charakteristickou stavbu:

- Os metatarsale I – kratší silná kost, na proximálním konci baze má ledvinovitou kloubní plochu pro os cuneiforme mediale a na plantární straně baze vybíhá v tuberositas ossis metatarsi I.
- Os metatarsale II – nejdelsí z nártních kostí, je vložena mezi všechny tři ossa cuneiformia (na bazi má 3 styčné plošky).
- Os metatarsale V – laterální strana baze vybíhá ve tuberositas ossis metatarsi V (je hmatná).

Osifikace nártních kostí

Stejně jako metakarpy jsou i metatarzy monoepifýzové kosti. Osifikace tedy probíhá z diafýzy a z jejich jediné epifýzy. U 1. metatarzu je epifýza při bazi (podobně jako u kostí článků prstů). U 2.-5. metatarzu leží epifýza při hlavici kosti. V koncích bez epifýz se mohou objevit jejich náznaky – pseudoepifýzy.



Metatarzální kosti

Samotný proces osifikace začíná v diafýzách kolem 9. týdne prenatálního vývoje (v 1. a 5. metatarzu od 10. týdne). V epifýzách se objevují osifikační jádra od 3. roku postnatálně. Diafýzy srůstají s epifýzami mezi 17. až 20. rokem života.

Variace nártních kostí

Nejčastější je **os Vesali (os Vesalianum)** = samostatně osifikující tuberositas ossis metatarsi V. Vzniká v důsledku fylogenetického vývoje, protože je to element tarzu, který se k 5. metatarzu připojuje až druhotně.

Os intermetatarsale (Gruberi) = dočasný element z mesenchymu či chrupavky. Objevuje se v embryonálním vývoji mezi bazemi os metatarsale I a II (těsně při ossa cuneiformia).

Kloubní spojení

- **Articulationes tarsometatarsales** – mezi tarzy a bazemi metatarzů. Skládá se ze tří kloubů:
 1. os cuneiforme mediale – baze os metatarsale I,
 2. os cuneiforme intermedium et laterale – os metatarsale II et III,
 3. os cuboideum s os metatarsale IV et V.
 - zpevněny pomocí tarsometatarsálních vazů (plantaria, dorsalia, interossea).
- **Articulationes intermetatarsales** – spojují baze jednotlivých metatarzů.
- **Articulationes metatarsophalangeae** – spojují hlavice metatarsů s jamkami na proximálních článcích prstů,
 - zpevněny pomocí metatarsophalangeálních vazů (collateralia, plantaria) a také pomocí ligamentum metatarsale transversum profundum.

Odkazy

Související články

- Klouby nohy
- Kost
- Articulationes

Použitá literatura

- ČIHÁK, Radomír. *Anatomie I*. 2. vydání. Praha : Grada, 2001. 516 s. ISBN 978-80-7169-970-5.