

Procvičování: Patofyziologie kardiovaskulárního systému/pokračování 28

1 U Fallotovy tetralogie nacházíme

- ☐ hypertrofii pravé komory
- ☐ hypertrofii levé komory
- ☐ cyanózu
- ☐ defekt komorového septa

2 Zvýšení tlakové amplitudy v arteriálním řečišti je typickým nálezem u

- ☐ stenózy aortální chlopně
- ☐ stenózy mitrální chlopně
- ☐ insuficience aortální chlopně
- ☐ insuficience mitrální chlopně

3 Arteriální hypertenze patří do obrazu následujících onemocnění a syndromů

- ☐ metabolický (Reavenův) syndrom
- ☐ Addisonův syndrom (nedostatečnost kůry nadledvin)
- ☐ Cushingův syndrom
- ☐ koarktace aorty

4 Arteriální hypertenze

- ☐ se rozlišuje primární, sekundární a terciární
- ☐ má vztah k dennímu příjmu NaCl
- ☐ zřídka vede k orgánovým komplikacím
- ☐ urychluje mj. vznik aterosklerózy

5 Arteriální hypertenze

- ☐ může vést k systolické dysfunkci myokardu
- ☐ může vést k diastolické dysfunkci myokardu
- ☐ snižuje preload
- ☐ snižuje afterload

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvičování_Patofyziologie_kardiovaskulárního_systému/pokračování_27)

Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvičování_Patofyziologie)

Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvičování_Patofyziologie_kardiovaskulárního_systému/pokračování_29)

Našli jste chybu? Napište!