

Procvičování: Patofyziologie nervového systému/pokračování 15

1 Incidence clusterové bolesti je

- ☐ vyšší u žen než u mužů
- ☐ stejná u obou pohlaví
- ☐ vyšší u mužů než u žen
- ☐ v prepubertálním období stejná u obou pohlaví

2 Mezi hypersomnie patří

- ☐ pavor nocturnus (noční děs)
- ☐ narkolepsie
- ☐ kataplexie
- ☐ spánková obrna

3 Mezi příčiny nitrolební hypertenze řadíme

- ☐ expanzivní procesy nitrolební – malacie, nádory
- ☐ poruchy pasáže likvoru
- ☐ status epilepticus
- ☐ subdurální hematom

4 Podkladem tenzní bolesti je

- ☐ uvolnění neurotransmiterů z nervových zakončení
- ☐ zvýšení hladiny Ca^{2+} v plazmě
- ☐ přestup kalia z intra- do extracelulární tekutiny a relativní snížení hladiny Ca^{2+} v plazmě
- ☐ přestup natria z extra- do intracelulární tekutiny a relativní zvýšení hladiny Ca^{2+} v plazmě

5 Postižení bazálních ganglií u Wilsonovy choroby se projevuje

- ☐ klidovým třesem
- ☐ svalovou dystonií
- ☐ rigiditou
- ☐ athetotickými, případně choreatickými pohyby

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_nervov%C3%A9ho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_14) Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_nervov%C3%A9ho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_16) Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_nervov%C3%A9ho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_16)

Našli jste chybu? Napište!