

Apostasis auriculae



Odstávající boltec je častá, nezávažná vývojová vada, ve velké míře dědičná. Může být na jedné straně, většinou je však na obou. Obvykle bývá spojena i s **odstávajícími ušními lalůčky** a rozmanitými **odchylkami tvarování boltce**. Příčinou je buď **zvětšený úhel úponu boltce** (nad 40°), či **zvýšení dorsální stěny cavitas conchae**.

Kosmetická úprava spočívá v **otoplastice** cestou změkčení chrupavky, jejích drobných výsečí a nářezů, a finální remodelaci a fixaci boltce v novém postavení.



Před plastikou

Odkazy

Související články

- Ucho
- Vrozené vady boltce
- Vrozené vady zevního a středního ucha

Zdroj

- HYBÁŠEK, Ivan a Jan VOKURKA. *Otorinolaryngologie*. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2006. 0 s. ISBN 80-246-1019-1.
- VOKURKA, Martin a Jan HUGO, et al. *Velký lékařský slovník* [online] . 8. vydání. Praha : Maxdorf, 2009. 1144 s. Dostupné také z <<http://lekarske.slovníky.cz/>>. ISBN 978-80-7345-166-0.



Po plastice