

# Ashermanův syndrom

**Ashermanův syndrom (amenorrhoea traumatica, amenorrhoea atretica)** je sekundární amenorea v důsledků synechií po zákrocích na děložním endometriu.

## Etiologie

Jedná se o iatrogenní poškození nešetrnými anebo opakovanými instrumentálními revizemi dutiny děložní. Následným zánětem může vzniknout poškození endometria. Může se vyskytnout po kyretáži, myomektomii nebo jako komplikace v souvislosti s umělým ukončením těhotenství.

## Klinické projevy

Jedná se o pozdní komplikace zákroku projevující se morfologickými změnami, spojenými s trvalou atrofií endometria a adhezemi v děložní dutině.

## Komplikace

Tyto morfologické změny mohou vyvolat sekundární amenoreu a být závažnou příčinou sekundární sterility či poruch vývoje placenty v event. těhotenství.

## Odkazy

### Související články

- Amenorea
- Poruchy cyklického krvácení
- Kyretáž

### Použitá literatura

- ČECH, Evžen. *Porodnictví*. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. s. 484. ISBN 8024713039.
- VOKURKA, Martina a Jan HUGO, et al. *Velký lékařský slovník*. 6. vydání. 2006. 0 s. ISBN 80-7345-105-0.

### Reference

1. ČECH, Evžen, Zdeněk HÁJEK a Karel MARŠÁL, et al. *Porodnictví*. 2. vydání. Praha : Grada, 2006. 544 s. ISBN 80-247-1303-9.

## Ashermanův syndrom

Asherman's syndrome



HSG dělohy, můžeme si všimnout dělohu v tvaru T (T-shaped)

**Rizikové faktory** výkony na dělohe<sup>[1]</sup>

### Klasifikace a odkazy

**MKN** N85.6 (<https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/N85.6>)

**MeSH ID** D006175 (<https://www.medvik.cz/bmc/link.do?id=D006175>)

**MedlinePlus** 001483 (<https://medlineplus.gov/ency/article/001483.htm>)