

Citrobacter

Citrobacter je rod gram-negativních koliformních bakterií z čeledi **Enterobacteriaceae**, který je poměrně častým oportunním patogenem pro člověka. Mezi nejběžnější druhy patří **Citrobacter freundii** a **Citrobacter koseri** (ve starší literatuře označovaný jako *Citrobacter diversus*).

Citlivost a kultivace


Citlivost a kultivace je podobná jako u jiných enterobakterií. Na Endově půdě jsou některé kmeny velmi podobné *E. coli*, jiné kmeny naopak salmonelám.

Biochemické vlastnosti

Zástupci rodu Citrobacter můžou tvořit **sirovodík**, biochemicky podobný salmonelám. Rod je samozřejmě **laktóza pozitivní**, takže by neměl tvořit světlé kolonie s černým středem, například na půdě jakou je XLD (*xylene lysine deoxycholate*). Občas se stane, že se mohou vyskytnout kmeny, které tvoří laktózu opožděně, nebo vůbec. Každopádně si zachovávají pozitivitu na ONPG test (orto-Nitrofenyl-β-galaktozid) a PYR test. Při diagnostice rodu Citrobacter je důležité mít na paměti, že antigenně mohou reagovat zkříženě se salmonelami a podobně můžou reagovat i s kmeny STEC (*Shiga toxin producing E.coli*).

Patogenita

Citrobacter je oportunní patogen ve střevě. Svojí patogenitou se prezentuje i v močových cestách a mezi další infekce patří **bakterémie**, endokarditidy, meningitidy (i u novorozenců) a mozkové abscesy. Ve výjimečných případech způsobuje osteomyelitidu u dětí. K těmto komplikacím vede často primárně intraabdominálně infekce, způsobená důsledkem neinfekčních procesů, jako například žlučové kameny nebo též nádory v dutině břišní.



Citrobacter freundii

Virulence

Mezi faktory virulence patří **aerobaktinový systém získávání železa**. V případě mozkových infekcí se uplatňuje **zvýšená schopnost pronikání hematoencefalickou bariérou**.

Diagnostika

Diagnostika rodu **Citrobacter** je založená převážně na biochemii. Na rozlišení Citrobacteria (opožděná fermentace laktózy) od Salmonely se dá použít **test ONPG**. Alternativní metodou rozlišení je **PYR-test** (citrobacter – pozitivní, salmonela – negativní).

Přenos

Přenos je zpravidla fekálně-orální a mimoštřevní infekce jsou výlučně endogenní.

Terapie

Citrobacter je primárně rezistentní na céfalosporiny I. a II. generace. Jako účinný se ukazuje **ko-amoxicilín**, **céfalosporiny III. generace** jsou taktéž účinné, ale musí být používáné jen v závažných případech. A i v případě Citrobakteru přibývají kmeny tvořící široko-spektrální betalaktamázu, hlavně kmeny málo virulentní, které můžou přenášet svoje geny kódující rezistenci na virulentní kmeny jiných enterobakterií.

Odkazy

Zdroj

- VOTAVA, Miroslav, et al. *Lékařská mikrobiologie speciální*. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.

Použitá literatura

- VOTAVA, Miroslav, et al. *Lékařská mikrobiologie speciální*. 1. vydání. Brno : Neptun, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5.

