

Diskuse:Farmakologie v přednemocniční neodkladné péči/SŠ (sestra)

Postup redakčního zpracování



K redakční kontrole ještě zbývá • zdroje • citace • synonyma a název • obrázky a licence

V článku bylo zkontrolováno • kategorie a portály • členění a nadpisy • prolinkování • pravopis • typografie

Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send

Cancel

Připomínky k článku

Adrenalin (epinefrin)

Dobrý den, u anafylaxe je uvedené dávkování pro podání i.m., které je primární. Případně může následovat i.v. podávání. V případě intravenózního epinefrinu musí být dávka titrována pomocí 50 mikrogramů bolusů podle reakce. Tato dávka může být podána pouze s použitím roztoku 0,1 mg/ml (tj. 1:10 ml ředění obsahu ampule). Nepodávejte i.v. neředěný roztok 1 mg/ml epinefrinu. (Zdroj databáze léčiv) -- 37.188.140.78 3. 3. 2024, 11:13

(CET) Answer

New comment

Send

Cancel

Nezkontrolováno!!!

Pozor stránka není zkontrolována stran dávek!!! Ketamin je zcela chaotický --DRobert (diskuse) 28. 11. 2020, 10:49

(CET) Answer

New comment

Send Cancel