

Diskuse:Priapismus

Postup redakčního zpracování

K redakční kontrole ještě zbývá • citace • kategorie a portály • synonyma a název • členění a nadpisy • obrázky a licence • prolinkování • typografie
V článku bylo zkontrolováno • zdroje • pravopis

Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send Cancel

Připomínky k článku

Článek ke kontrole



Žádá se kontrola tohoto článku učitelem.

Navržený učitel: doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.

Rozdělení priapismu

Existují dva typy priapismu *nízkoprůtokový*, kdy opravdu dochází k ischemii topořivých těles (kromě topořivého tělesa kolem močové trubice, tzv. spongiozního tělesa), krev není odváděna zpět a *vysokoprůtokový*, kdy je erekce způsobená nadměrným průtokem krve topořivými tělesy, krev je normálně okysličená a k ischemizaci nedochází

Oba dva stavy považujeme za akutní s nutností rychlé léčby.

Answer

New comment

Send Cancel

Rozdělení priapismu

Existují dva typy priapismu *nízkoprůtokový*, kdy opravdu dochází k ischemii topořivých těles (kromě topořivého tělesa kolem močové trubice, tzv. spongiozního tělesa), krev není odváděna zpět a *vysokoprůtokový*, kdy je erekce způsobená nadměrným průtokem krve topořivými tělesy, krev je normálně okysličená a k ischemizaci nedochází

Oba dva stavy považujeme za akutní s nutností rychlé léčby.

Answer

New comment

Send

Cancel