

Diskuse:Riboflavin

Postup redakčního zpracování

K redakční kontrole ještě zbývá

V článku bylo zkontrolováno • zdroje • citace • kategorie a portály • synonyma a název • členění a nadpisy • obrázky a licence • prolinkování • pravopis • typografie

Dokážete-li některé z doporučených úprav provést, směle se do nich pusťte! V případě jakýchkoli nejasností se můžete podívat do nápovědy nebo se nás zeptat, rádi Vám pomůžeme.

Refresh page

New thread

New comment

New comment

Send

Cancel

Připomínky k článku

Je-li doporučená denní dávka pro dospělé: 1,2–1,5 mg, pak dost dobře nemůže být indikátorem nedostatku pokles vylučování vit. B2 pod 32 mg/24 hod. Některé známky nedostatku nejsou obvykle v renomovaných publikovaných zdrojích uváděny. Například i podle posledních publikací v MEDLINE, (Aschoff R, Kempter W, Meurer M. Hautarzt. [Seborrheic dermatitis]. 2011 Apr;62(4):297-307 i jiné publikace) je etiologie seborhoické dermatitidy neznámá a uvažuje se s možnou úlohou kvasinek *Malassezia* nebo jejich metabolitů. --MUDr. Eva Kudlová, Csc. 20. 2. 2012, 16:20 (CET)