

# Fórum:Testy2/Pick N

Otázky typu „vyber N odpovědí“ (anglicky *pick N*) jsou podobné otázkám s jedinou nejlepší odpovědí (SBA) nebo rozšířeným přiřazovacím otázkám (EMQ). Liší se v tom, že zkoušený má z nabídnutého seznamu možných odpovědí vybrat dvě až pět možností.

*U 50letého muže se postupně začíná objevovat zmatenost, dezorientace a porucha krátkodobé paměti. Má parézu levé dolní končetiny. V krevním nátěru je mikrocytóza a bazofilní tečkování erytrocytů. Vyberte dvě nejpravděpodobnější příčiny:*

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <i>A. Diabetická polyneuropatie</i>       | <i>F. Roztroušená skleróza</i>      |
| <i>B. Huntingtonova choroba</i>           | <i>G. Parkinsonova choroba</i>      |
| <i>C. Laterální míšní syndrom</i>         | <i>H. Gliom pontu</i>               |
| <i>D. Encefalopatie při otravě olovem</i> | <i>I. Tabes dorsalis</i>            |
| <i>E. Meduloblastom</i>                   | <i>J. Wernickeova encefalopatie</i> |

*Pokud by v tomto případě měl zkoušený vybrat jedinou nejlepší odpověď, byla by otázka sporná: nejpravděpodobnější je diagnóza B, avšak dosti pravděpodobná je i možnost H. Další navrhované možnosti jsou výrazně horší odpovědi. Má-li zkoušený zvolit dvě možnosti, je řešení poměrně jednoznačné.*

Často se tento typ používá při zkoušení volby postupu v určité situaci, kdy se např. ordinuje několik vyšetření současně, nebo se provádí několik léčebných opatření najednou či téměř najednou.

V zadání je třeba definovat očekávaný počet odpovědí. Tím se z otázky typu mnohočetného výběru *ano/ne* stane otázka typu výběru nejlepší odpovědi.