


Gestační trofoblastická nemoc

Gestační trofoblastická nemoc^[1] je **fetální invaze tkání**, která se vymyká běžným kontrolním mechanismům. Běžně by invaze trofoblastu měla zanikat **do 30 dnů** po ukončení těhotenství (porod, potrat, ektopická gravidita)^[1]. Rozlišujeme *mola hydatidosa partialis*, *mola hydatidosa completa*, *mola hydatidosa proliferans* a *choriokarcinom*.

Parciální (inkompletní) mola


Mola hydatidosa partialis (MHP) vzniká oplozením vajíčka dvěma spermiimi najednou (69,XXX; 69,XXY). Tako vzniklá **triploidní zygota** má dvě sady otcovských a jednu sadu mateřských haploidních chromosomů. Malignizuje raritně. Klinicky se vyskytuje nepravidelné krvácení v prvním trimestru (kvůli vývojovým vadám se plod jen výjimečně dožívá porodu, pokud se dožije, vždy po něm umírá). Léčbou je vakuumexhausce a RCUI, dispenzarizace a monitoring hladin hCG.



Parciální mola

Kompletní mola


Mola hydatidosa completa (MHC) vzniká **oplozením prázdného vajíčka** (0 chromozomů) dvěma spermiimi najednou (46,XX; 46,XY), nebo jednou spermií, která se endoreduplikuje (46,XX). Obě sady chromozomů jsou tak paternálního původu. Embryo se nemůže vyvijít, klky jsou bezcévnaté, edematovité, se vzhledem „hrozníčků vína“^[1]. Na ultrazvuku je patrný obraz „sněžení“^[1]. Malignizuje ve 4-8 %^[1]. Léčbou je vakuumexhausce a RCUI, dispenzarizace a monitoring hladin hCG.



Kompletní mola

Proliferující mola

Mola invasiva (*mola proliferans*, *mola destruens*, MP) je nejagresivnější. Biologicky je nejisté povahy. Léčba je vakuumexhausce a RCUI, ve 20 % je nutná chemoterapie.



Proliferující mola

Choriokarcinom

🔍 Podrobnější informace naleznete na stránkách Nádory germinální, Neepitelové nádory ovária.

Choriokarcinom je epitelový nádor buněk trofoblastu. Metastazuje časně hematogenně do pochvy, plic, jater a mozku^[1].

Je nejlépe léčitelným zhoubným nádorem, léčí se metotrexátem nebo aktinomycinem D v mono- nebo polychemoterapii s kurativním záměrem ve všech stádiích s dobrou prognózou. Léčba se provádí ve specializovaném centru.

Tabulka

| Kritérium | Kompletní mola | Parciální mola |
|-------------------------|---|---|
| Karyotyp | Diploidní (46;XX/XY) | Triploidní (69;XXX/Y) |
| Vznik | Androgenní 2x spermie + vajíčko bez X 1x spermie + vajíčko bez X => duplikace | Smíšený 2x spermie + normální vajíčko 1x 46 XX/Y spermie + normální vajíčko |
| Embryo | Nikdy! | Umíra do 10. týdne |
| Klky | Avaskulární | Vaskularizované |
| Trofoblast | Difúzní proliferace | Fokální proliferace |
| Atypie (buněčné) | Ano | Ne |
| hCG | Hodně zvýšené | Normální |
| Choriokarcinom | 2% | Vzácný |

Odkazy

Související články

- Zhoubné nádory v gynekologii
- Germinální nádory
- Zhoubné nádory ovaríí

Externí odkazy

- [www.onkogyn.cz \(http://www.onkogyn.cz/\)](http://www.onkogyn.cz/)

Reference

1. ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. *Gynekologie*. 2. vydání. Praha : Galén, 2008. 390 s. s. 211-213. ISBN 978-80-7262-501-7.