

Hemicrania continua



Hemicrania continua je primární bolestí hlavy, která je **častější u žen**, trvá **minimálně 3 měsíce** bez úlevy, je **jednostranná** s měnlivým průběhem **středně těžké až těžké intenzity** s alespoň **jedním z následujících symptomů**:

- konjunktivální injekce, lakrimace nebo obojí;
- nasální kongesce, rhinorea nebo obojí;
- ptosa, mióza nebo obojí;^[1]

a **úlevou při léčbě Indomethacinem**.^[2]

Na PET lze prokázat změny v mezencephalu, což hemicranii odlišuje od migrény a cluster headache. V terapii se užívá **Indomethacin** v dávce 75–150 mg/den a užívá se i v prevenci nových epizod. Léčba Indomethacinem může být celoživotní, i když dávka se může po čase snížit.^[1]

Odkazy

Související články

- Bolesti hlavy

Externí odkazy

- Hemicrania continua, NINDS (https://www.ninds.nih.gov/disorders/hemicrania_continua/hemicrania_continua.htm)

Reference

1. BRUST, John C. M. *Current diagnosis and treatment, Neurology*. 2. vydání. Singapore : McGraw-Hill, 2012. ISBN 9780071326957.
2. -*NINDS Hemicrania Continua Information Page* [online]. Poslední revize November 30, 2012, [cit. 2012-12-14]. <https://www.ninds.nih.gov/disorders/hemicrania_continua/hemicrania_continua.htm>.