

# Hodnocení inervace obličeje


## Inervace obličeje

### Senzitivní – *n. trigeminus*

- Hodnotí se palpačně v místě výstupů větví nervu trigeminu (*foramen supraorbitale, foramen infraorbitale, foramen mentale*) – při afekcích je palpace bolestivá.
- **3 výstupy:**
  - *n. supraorbitalis;*
  - *n. infraorbitalis;*
  - *n. mentalis.*

### Motorická – *n. facialis*

- Porucha:
  - **Centrální:** mozkové příhody – obrna dolní větve *n. facialis* – vyhlazení *sulcus nasolabialis*, pokleslý koutek.
  - **Periferní:** prochlazení – Bellova nemoc – obrna i horní větve *n. facialis* – nemůže pokrčit čelo, sevřít víčka, příznak dýmky.
- Vyšetření: požádáme pacienta, aby se zamračil (a sraštil čelo), aby nafoukl tváře, vycenil zuby a zapískal. Pokud má inervaci poškozenou, tyto úkony nezvládne.



Senzitivní inervace obličeje



Bellova obrna: pokleslý koutek, vyhlazená nasolabiální rýha, neschopnost sraštit čelo

## Odkazy

### Související články

- Nervus facialis
- Obrna lícního nervu
- Nervus trigeminus

### Použitá literatura

- CHROBÁK, Ladislav, et al. *Propedeutika vnitřního lékařství*. 2. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.