

Horní postranní stálý řezák

Malý řezák je tvarově podobný střednímu řezáku, na rozdíl od něj je však menší a gracilnější. Tvarově vykazuje zub poměrně značnou variabilitu, nacházíme rudimentární, tzv. **čípkovitý** tvar, relativně často není zub vůbec založen. Jedná se o pilíř III. třídy dle Voldřicha.

Labiální ploška je konvexní, výrazněji v meziální části. Rýhování se objevuje zřídka.

Palatinální ploška je silně konkávní, její okraje lemují sklovinné lišty. V krčkové části pak nacházíme dobře vyvinuté tuberculum dentale, na koronární straně hrbolku bývá vytvořená prohlubeninka – foramen caecum, která může být místem invaginace skloviny a dentinu – vzniku dens in dente.

Aproximální plošky jsou vyklenuté, mají tvar trojúhelníku. Stejně jako u středního horního řezáku je meziální plocha rovnější, do incizální hrany přechází pod ostřejším úhlem. Naproti tomu distální plocha je více konvexní a k řezací hraně se sklání postupně.

Kořen je jeden, štíhlejší a slabší než kořen středního horního řezáku. Na průřezu má oválný tvar, oploštělý meziodistálně. Od střední roviny se kořen často odklání směrem palatinálním či distálním. Kořenový kanálek je rovněž jeden, sleduje tvar a zakřivení kořene, což z něj činí zub velice obtížně ošetřitelný endodonticky.



Horní postranní stálý řezák

Odkazy

Související články

- Horní střední stálý řezák
- Horní stálý špičák
- Dolní stálé řezáky
- Dolní stálý špičák

Použitá literatura

- JANSOVÁ, K a M EBER. *Preklinická stomatologie : I. část - morfologická*. 2., dopl. vydání. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 72 s. s. 39-55. ISBN 80-7067-596-9.
- ŠEDÝ, Jiří a René FOLTÁN. *Klinická anatomie zubů a čelistí*. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. ISBN 978-80-7387-312-7.