

# Jaterní selhání

- **Akutní jaterní selhání** – život ohrožující selhání jaterních funkcí (syntetických, biotransformačních) vzniklé do 8 týdnů od prvních projevů, hlavním rysem je jaterní encefalopatie.
- **Chronické jaterní selhání** - postupný rozvoj příznaků.

## Příčiny

Nejčastější příčiny akutního selhání:

1. virová hepatitida (tzv. fulminantní) – zvláště VHA, VHB;
2. intoxikace léky (paracetamol, halothan) nebo toxickými látkami (otrava houbami, drogy – extáze);
3. metabolické poruchy (Wilsonova choroba, Reyův syndrom);
4. venostáza (akutní Buddův-Chiariho syndrom, šok, P selhání).

### Příčinou je masivní nekróza hepatocytů.

Příčinou chronického jaterního selhání je cirhosa jater (nejčastěji alkoholická), jaterní nádory a metastázy do jater

## Klinické projevy

- neurčité příznaky (nevolnost, slabost, nausea, bolesti břicha, ...), později ikterus, krvácivé projevy, infekční komplikace, metabolické komplikace (poruchy ABR a elektrolytů, hypoglykemie);
- klinicky rozhodující známkou jaterního selhání je kvalitativní i kvantitativní porucha vědomí – jaterní encefalopatie a mozkový edém (vasogenní i cytotoxický – hlavní příčina smrti u ALF).
- Chronické jaterní selhání se projevuje pomalejším nástupem jaterní encefalopatie s typickým třesem a rozvojem portální hypertenze.



## Diagnostika

- Laboratorní vyšetření – hyperbilirubinemie, ↑ AST a ALT, prodloužení PT, hypoglykemie, hyperammonemie.
- Zobrazovací metody – na CT edém mozku, nejlépe monitorovat nitrolební tlak (ICP).

## Léčba

- kauzální možná pouze u otravy paracetamolem (N-acetylcysteinem), u otravy muchomůrkou zelenou se podává aktivní uhlí, provádí se forsírovaná diuréza a podává se silibilin a G-PNC;
- širokospektrá ATB;
- léčba koagulopatie – mražená plasma (nahrada koagulačních faktorů), vitamin K;
- antiulcerózní léky;
- úprava vnitřního prostředí;
- léčba hypoglykemie – infuze glukózy;
- léčba jaterní encefalopatie (dieta, laktulóza, ATB);
- léčba mozkového edému – zvýšená poloha hlavy, diureтика (manitol, furosemid), řízená hyperventilace, barbituráty;
- léčba arytmii (vznikají vlivem poruch ABR), případná hypotenze se léčí katecholaminy;
- léčba renálního selhání – vysazení nefrotoxicických léků, kontinuální eliminační metody;
- u těžkého jaterního selhání možná pouze transplantace jater.

## Odkazy

### Externí odkazy

-  AKUTNE.CZ Otrava houbami— interaktivní algoritmus + test (<http://www.akutne.cz/index.php?pg=vyukove-materialy--rozhodovaci-algoritmy&tid=346>)

### Související články

- Jaterní selhání (pediatrie)
- Jaterní testy
- Hepatitidy
- Hepatogenetický diabetes a metabolizmus sacharidů

## Reference

- PASTOR, Jan. *Langenbeck's medical web page* [online]. [cit. 2010]. <<http://langenbeck.webs.com>>.



### Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (<https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Jatern%C3%ADselh%C3%A1n%C3%AD&action=history>) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.