

# Klasifikace středoušních zánětů

Rozlišujeme záněty:

- **hnisavé a nehnisavé;**
- **akutní a chronické.**

Základními 4 typy mezotitid jsou:

1. **akutní tubotympanální katar** (catarrhus tubae auditivae acutus, hydrotympanon);
2. **chronický tubotympanální katar** (catarrhus tubotympanalis chronicus, sekretorická mezotitida, otitis media secretorica – OMS, klišové ucho – glue ear);
3. **akutní hnisavá mezotitida** (otitis media suppurativa acuta, otitis media acuta – OMA)
4. **chronická hnisavá mezotitida** (otitis media suppurativa chronica, otitis media chronica)



Akutní zánět středního ucha – exsudát vyklenuje membránu laterálně

## Odkazy

### Související články

- Komplikace středoušních zánětů
- Záněty středního ucha (rozcestník)

### Použitá literatura

- KLOZAR, Jan, et al. *Speciální otorinolaryngologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.
- CHROBOK, Viktor a Roman MICHÁLEK. Diagnostika a léčba středoušního zánětu z pohledu ORL lékaře. *Lékařské listy* [online]. 2009, vol. 15, s. 30, dostupné také z <<https://zdravi.euro.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/diagnostika-a-lecba-stredousniho-zanetu-z-pohledu-orl-lekare-445464>>. ISSN 1214-7664.



### Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Klasifikace\\_st%C5%99edou%C5%A1n%C3%ADch\\_z%C3%A1n%C4%9Bt%C5%AF&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Klasifikace_st%C5%99edou%C5%A1n%C3%ADch_z%C3%A1n%C4%9Bt%C5%AF&action=history)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.