

Komplikace tonsillitid

Ke komplikacím tonsilitid dochází v důsledku:

- lokálního, lymfogenního nebo hematogenního **šíření infekce**;
- uvolnění bakteriálních **toxinů**;
- **imunopatologické reakce** organismu.

Komplikace tonsilitid lze rozdělit do 2 skupin:

1. **komplikace místní**,
2. **komplikace celkové**.

Místní komplikace

- intratonsilární absces,
- paratonsilární absces nebo flegmona (nejčastější komplikace tonsilitid),
- parafaryngeální absces nebo flegmona,
- retrofaryngeální absces,
- absces nebo flegmona hypofaryngu,
- flegmona ústní baze,
- abscedující lymfadenitida krku.

Celkové komplikace

- tonsilogenní sepse,
- trombóza kavernózního sinu,
- syndrom toxického streptokokového šoku,
- revmatická horečka.


Odkazy

Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 2009]. <http://jirben2.chytrak.cz/materialy/orl_jb.doc>.

Použitá literatura

- KLOZAR, Jan, et al. *Speciální otorinolaryngologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. 224 s. ISBN 80-7262-346-X.



Paratonsilární absces

Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Komplikace_tonsillitid&action=history) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.

