

Migrující tromboflebitida



Trombophlebitis migrans je získaná koagulopatie, která se vyskytuje jako **paraneoplastický syndrom** typicky u adenokarcinomů (nejčastěji pankreatu). Je charakterizována rekurentním migrujícím zánětem povrchových žil, projevujícím se bolestivými zarudlými ložisky s celkovými příznaky zánětlivého onemocnění.^[1]

Je označována i jako *Trousseauovo znamení*, podle Amanda Trousseaua, který sám na sobě stav popsal v souvislosti s diagnostikovaným karcinomem žaludku. Potvrzuje souvislost hyperkoagulačního stavu s viscerální malignitou.^[2]

Pozor, neplést se stavem zvaným Trousseauův příznak!

Odkazy

Související články

- Tromboflebitida povrchových žil
- Trombembolická nemoc
- Paraneoplastický syndrom

Externí odkazy

- Kazuistika migrující tromboflebitidy (<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1953332/?page=1>)

Zdroj

1. THAYALASEKARAN, Sreedhari, Helen LIDDICOAT a Eleanor WOOD. Thrombophlebitis migrans in a man with pancreatic adenocarcinoma: a case report. *Cases Journal*. 2009, roč. 1, vol. 2, s. 6610, ISSN 1757-1626. DOI: 10.1186/1757-1626-2-6610 (<http://dx.doi.org/10.1186%2F1757-1626-2-6610>).
2. WIKIPEIDA,. *Trousseau sign of malignancy* [online]. [cit. 2018-01-16]. <https://en.wikipedia.org/wiki/Trousseau_sign_of_malignancy>.