

Musculus biceps femoris

Začátek:

1. caput longum – tuber ischiadicum;
2. caput breve – labium laterale lineae asperae.

Úpon: capitulum fibulae.

Inervace: n. ischiadicus / při vysokém štěpení: n. tibialis (caput longum), n. fibularis communis (caput breve).


Funkce:

1. kolenní kloub – flexe;
2. kyčelní kloub – extenze, zevní rotace.

Odkazy

Použitá literatura

- ČIHÁK, Radomír a Miloš GRIM. *Anatomie*. 2., uprav. a dopl vydání. Praha : Grada Publishing, 2002. 470 s. sv. 1. ISBN 80-7169-970-5.
- VIGUÉ, Jordi. *Atlas lidského těla*. 3. vydání. Čestlice : Rebo, 2007. ISBN 978-80-7234-881-7.

| musculus biceps femoris | |
|--|--|
| dvojhlavý sval stehenní | |
|  | m. biceps femoris dx. (pohled zezadu) |
| TA | A04.7.02.032 (http://ifaa.unifr.ch/Public/EntryPage/TA98%20Tree/Entity%20TA98%20EN/04.7.02.032%20Entity%20TA98%20EN.htm) |
| Funkce | flexe v kolenním kloubu, extenze a zevní rotace v kyčelním kloubu |
| Inervace | n. ischiadicus (popř. n. tibialis, n. fibularis communis) |
| Začátek | tuber ischiadicum, labium laterale lineae asperae |
| Úpon | capitulum fibulae |
| Antagonista | musculus quadriceps femoris |

