

Nepravidelnosti pánve

Kostěné nepravidelnosti

Zúženou pánev popisujeme pánev, která má **alespoň jeden z rozměrů pánevních menší**. Tato situace je poměrně vzácná, nastává u **1 - 2 % porodů**.

Příčiny mohou být např. **posttraumatické**, drobná postava ženy, následky křivice apod.

O samotném porodu rozhoduje lékař v závislosti na různých faktorech, např:

- velikost plodu
- nízká výška ženy (pod 160 cm)
- gynekologická anamnéza (probíhající patologie při předešlých porodech apod.)
- traumata pánve
- ortopedické choroby

Diagnostika nepravidelnosti pánve

- **ultrazvuk**
- **pelvimetrie**
- porovnání **vzdálenosti symfýza-promontorium a bilaterální průměr hlavičky** (alespoň 2 cm rozdíl)

Nepravidelnosti měkkých tkání

Často se jedná o vývojové vady, vysoké stáří rodičky, anatomické změny v důsledku karcinomu, apod.

Typy nepravidelností měkkých tkání:

- **rigidita děložního hrdla**
- **nepravidelnosti pochvy** (hypoplázie, přepážky, stenózy)

Odkazy

Související články

- Pánev • Pánevní dno
- Pochva • Porod