

Píštěl



Je patologické spojení. Spojení může být vytvořeno i úmyslně, chirurgicky, v rámci léčby.

Příklady píštělí a jejich etiologie

Vrozené

- **Branchiogenní píštěl**

Získané

- **Oroantrální píštěl**

Vzniká jako patologické spojení čelistní dutiny a ústní dutiny po extrakci zubu. Příčinou je intimní vztah kořenů horních molárů a premolárů k čelistní dutině. Po extrakci je třeba provést Valsalvovu zkoušku a případnou oroantrální komunikaci uzavřít. Pokud komunikace persistuje kanálek je vystlán epitelem.

- **Shunt pro dialýzu**

Jedná se o úmyslně vytvořené arteriovenózní spojení. Využívá se u hemodialyzovaných pacientů.

- **Odontogenní píštěl**

Jedná se o patologickou komunikaci mezi odontogenní cystou a ústní dutinou, případně mezi odontogenní cystou a povrchem obličeje nebo čelistní dutinou.

Odkazy

Související články

- Karotido-kavernózní píštěl
- Periproktální píštěl
- Arteriovenózní píštěl

Zdroje

- STŘÍTESKÝ, Jan. *Patologie*. 1. vydání. Epava, 2001. ISBN 80-86297-06-3.