

# Příznak opozice šíje



Pacientu ležícímu na zádech provádíme anteflexi šíje. Jedná se tedy o **pasivní pohyb**. Při pozitivitě příznaku nelze anteflexi provést pro svalový odpor a provokaci bolesti. Opozici měříme na počet prstů, které se vejdou do prostoru mezi bradu a sternum.<sup>[1]</sup>

Příznak bývá pozitivní například při meningitidě nebo subarachnoidálním krvácení.<sup>[2]</sup>



Příznak opozice šíje

Příznak opozice šíje

## Odkazy

### Související články

- Meningeální jevy
- Meningeální syndrom

### Externí odkazy

- Neurologické vyšetření – norma (<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>) (Centrum elektronického vzdělávání 1.lf UK)
- Příznak opozice šíje – video (<https://el.lf1.cuni.cz/neuronorma/default/video/video48.html>) (Centrum elektronického vzdělávání 1.lf UK)

## Reference

1. ROTH, Jan, Ondřej FIALA a Evžen RŮŽIČKA. *Neurologické vyšetření - norma* [online]. [cit. 2012-11-22]. <<https://el.lf1.cuni.cz/neurologie>>.
2. LONGMORE, J. M. (J. Murray). *Oxford handbook of clinical medicine*. 8. vydání. Oxford : Oxford university press, 2010. 0 s. ISBN 9780199232178.