

Perikardiální třecí šelest

- výskyt: při perikarditidě nebo v prvních několika dnech po operaci na otevřeném srdci (tzv. *postperikardiotomický syndrom*)
- vzniká posouváním a třením zánětlivě změněných listů perikardu při pohybech srdce
- charakteristika: drsný, škrabavý, může připomínat křupání zmrzlého sněhu pod botou^[1]
- slyšitelný kdekoli na hrudníku, zesiluje při přitlačení fonendoskopu
- poslechové maximum: podél okraje sternu
- mění se s polohou – lépe slyšitelný v předklonu a vsedě^[1]

Odkazy

Související články

- systolické funkční šelesty: vibrační šelest (Stillův), pulmonální vypuzovací šelest, supraklavikulární šelest
- kontinuální funkční šelesty: vířivý žilní šelest

Reference

1. LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ, et al. *Preklinická pediatrie*. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. s. 119. ISBN 978-80-7262-438-6.



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Perikardi%C3%A1ln%C3%AD_t%C5%99ec%C3%AD_%C5%A1elest&action=history) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.