

Peritoneální karcinomatóza

Pseudomyxoma peritonei neboli **peritoneální karcinomatóza** je vzácné onemocnění na pomezí mezi benigním a maligním typem nádoru. Břišní dutina je vyplněna želatinovými (gelatinózními) hmotami s buňkami produkujícími mucin nebo gelatózní ascites. Pokud se tento stav neléčí, nádory rostou a spolu s produkováním mucinem utlačují okolní orgány.

 **Při neléčení může být útlakem poškozena i funkce jater.**

Nejčastější příčinou je **mucinózní cystadenom appendixu** (nádor žlázovového původu). Dále se zde mohou řadit nádory vaječníku a méně častěji nádory prsu, žlučníku, slinivky, žaludku, střev, močového měchýře nebo plic.

Paliativní metoda byla v minulosti pro tento typ nádorů jediná metoda léčby. Nyní se využívá cytoredukční chirurgie (CRS) spolu s HIPEC.

Odkazy

Související články

- HIPEC
- CRS

Použitá literatura

- JOSEF, Vodička,. *Speciální chirurgie*. - vydání. Karolinum Press, 2014. 318 s. ISBN 9788024625126.
- DERACO, Marcello. *Cytoreductive Surgery and Perioperative Chemotherapy for Peritoneal Surface Malignancy*. 2. vydání. Cine-Med Publishing, 2012. ISBN 978-1-941805-03-9.