

# Procvičování:Hypertenzní krize

Tento kvíz vychází z článku Hypertenzní krize.

Point added for a correct answer:

Points for an incorrect answer:

Ignore the questions' coefficients: ☐

[Shuffle questions](#)

**1** Jaké jsou dva hlavní druhy hypertenzní krize?

- ☐ Emergentní
- ☐ Urgentní
- ☐ Primární
- ☐ Sekundární
- ☐ Maligní
- ☐ Benigní

**2** Jaký může mít hypertenzní krize klinický korelát?

- ☐ bolesti hlavy
- ☐ bledost
- ☐ bolesti na hrudi
- ☐ parestezie
- ☐ poruchy vize
- ☐ neurologická symptomatika

**3** Jaký je doporučený postup při řešení emergentní hypertenze spojené s akutním srdečním selháním?

- ☐ Podání furosemidu a kontinuální infuze nitrátů
- ☐ Podání kaptoprilu a zvýšení tekutinového příjmu
- ☐ Urapidilový bolus a následná kontinuální infuze
- ☐ Podání enalaprilátu a zahájení betablokátorů

**4** Jak budeme snižovat tlak u aortální disekce?

- ☐ cílový systolický TK bude 100-120 mmHg během 20 min
- ☐ cílový systolický TK bude 120-140 mmHg během 20 min
- ☐ u aortální disekce TK nesnižujeme pro riziko hypoperfuze
- ☐ ke snížení tlaku můžeme využít kombinaci antihypertenziv (betablokátory, nitrát, urapidil)

**5** V těhotenství je kritická hodnota TK už 170/110 mmHg. Které léky můžeme pro snížení TK v těhotenství bezpečně použít?

- ☐ nitráty
- ☐ ACE inhibitory
- ☐ urapidil
- ☐ metyldopa
- ☐ blokátory kalciových kanálů
- ☐ betablokátory
- ☐ Sartany

[Submit](#)