

Procvičování: Patofyziologie kardiovaskulárního systému/pokračování 17

1 Komorová tachykardie

- ☐ je synonymem pro sinusovou tachykardii
- ☐ je závažnou arytmií vyžadující intenzivní léčbu a monitorování
- ☐ může přejít do fibrilace komor
- ☐ je běžná arytmie vyskytující se občas i u zdravých lidí

2 Mezi rizikové faktory, které při akutní ischemii myokardu přispívají ke vzniku fibrilace komor, patří

- ☐ vagová reakce se zvýšeným působením parasymptiku na myokard
- ☐ vznik krouživého impulsu (reentry fenomén) v ischemické tkáni
- ☐ zvýšený tonus sympatiku, navozený stresovou reakcí
- ☐ úplná atrioventrikulární blokáda převodu vzruchu

3 Mezi rizikové faktory fibrilace síní patří

- ☐ hypotyreóza
- ☐ hypokalémie
- ☐ hypertyreóza
- ☐ ischemická choroba srdeční

4 Mezi rizikové faktory vzniku fibrilace síní patří

- ☐ stenóza mitrální chlopně
- ☐ hypomagnesémie
- ☐ atrioventrikulární blokáda II. stupně
- ☐ Adams-Stokesův syndrom

5 Mezi syndromy preexcitace patří

- ☐ syndrom dlouhého QT intervalu
- ☐ Wenckebachovy periody
- ☐ Wolf-Parkinson-Wjiteův syndrom
- ☐ sick-sinus syndrom

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_16)

Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie)

Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_kardiovaskul%C3%A1rn%C3%ADho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_18)

Našli jste chybu? Napište!