

# Procvičování: Patofyziologie krve/pokračování 5

**1** Neefektivní krvetvorba (inefektivní erytropoéza) je součástí patogeneze

- ☐ anémie z nedostatku erytropetinu
- ☐ myelodysplastického syndromu
- ☐ megaloblastové anémie
- ☐ novorozenecké anémie

**2** Sideroblastická anémie může vzniknout při

- ☐ vysokém stupni neefektivní krvetvorby
- ☐ poruše syntézy hemu
- ☐ otravě olovem
- ☐ sníženém příjmu železa potravou

**3** Mezi extrakorpuskulární hemolytické anémie nepatří

- ☐ hemoglobinopatie S
- ☐ autoimunitní hemolytická anémie
- ☐ thalasémie
- ☐ paroxysmální noční hemoglobinurie

**4** Při anémii je parciální tlak kyslíku v arteriální krvi ( $paO_2$ )

- ☐ snížený
- ☐ normální
- ☐ zvýšený
- ☐ kolísavý

**5** Mezi korpuskulární hemolytické anémie nepatří

- ☐ srpkovitá anémie
- ☐ dědičná sférocytóza
- ☐ paroxysmální noční hemoglobinurie
- ☐ autoimunitní hemolytické anémie

Submit

← Předchozí ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:skripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie\\_krve/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_4](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:skripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_krve/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_4))

D\_patofyziologie)

Další → ([https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie\\_krve/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD\\_6](https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_krve/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_6))

Našli jste chybu? Napište!