

Procvičování: Patofyziologie nervového systému/pokračování 2

1 Hornerův syndrom zahrnuje následující příznaky

- ☐ poruchu vyprazdňování močového měchýře
- ☐ poruchu defekačního reflexu
- ☐ zrudnutí poloviny obličeje
- ☐ zúžení zornice (miózu)

2 Kauzalgie

- ☐ vznikají rozšířeným podrážděním z jednoho nervu na druhý
- ☐ jsou intenzivní pálivé bolesti při poranění nervů
- ☐ není segmentárně uspořádána
- ☐ vznikají z tlaku nebo natažení nervu při vyšetřovacím postupu

3 Kauzalgie

- ☐ je charakterizována pocitem bolesti v dermatomech
- ☐ je intenzivní pálivá bolest při poranění nervu
- ☐ vzniká z tlaku nebo natažení nervu při vyšetřovacím postupu
- ☐ vzniká iritační poruchou v talamu

4 Některé akutní neuropatie (např. syndrom Guillain-Barré) jsou provázeny

- ☐ demyelinizací nervových vláken
- ☐ zvýšenou tvorbou myelinu
- ☐ ukládáním myelinových depozit v nervosvalové ploténce
- ☐ ukládáním myelinových depozit v předních míšních rozích

5 Periferní obrna je obrazem poruchy

- ☐ buněk předních míšních rohů
- ☐ předních míšních kořenů
- ☐ zadních míšních kořenů
- ☐ motorických vláken hlavových nervů

Submit

← Předchozí (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_nervov%C3%A9ho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_1) Zpět na obsah (https://www.wikiskripta.eu/w/Port%C3%A1l:Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_nervov%C3%A9ho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_patofyziologie) Další → (https://www.wikiskripta.eu/w/Procvi%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD:Patofyziologie_nervov%C3%A9ho_syst%C3%A9mu/pokra%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD_3)

Našli jste chybu? Napište!