

Recidivující zánět středního ucha

Opakující se středoušní záněty u dětí jsou nejčastěji v prvních dvou letech života, přicházejí s respiračním onemocněním a opakují se několikrát do roka.

Příčiny

Především adenoidní vegetace nebo nedostatečně vyvinutý imunitní systém, alergie, dědičnost. Jednou z příčin může být i gastroezofageální reflux.

Prevence

Adenotomie

Terapie

Vždy je nutné vyšetřit humorální a buněčnou imunitu – poté příp. autovakcíny, imunomodulace. Vždy je nutné recidivu správně vyléčit. Význam má též klimatická léčba (Vysoké Tatry, moře), ale minimálně 14 dní. Léčba gastroezofageálního refluxu.

Odkazy

Související články

- Otitis media acuta
- Otitis media secretorica
- Otitis media chronica
- Sluch
- Klasifikace středoušních zánětů
- Akutní tubotympanální katar
- Komplikace středoušních zánětů

Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 2009]. <<http://jirben.wz.cz>>.

Použitá literatura

- HRODEK, Otto a Jan VAVŘINEC, et al. *Pediatric*. 1. vydání. Praha : Galén, 2002. ISBN 80-7262-178-5.
- ŠAŠINKA, Miroslav, Tibor ŠAGÁT a László KOVÁCS, et al. *Pediatric*. 2. vydání. Bratislava : Herba, 2007. ISBN 978-80-89171-49-1.