

Regio glutealis



Článek byl označen za rozpracovaný,

od jeho poslední editace však již uplynulo více než 30 dní

Chcete-li jej upravit, pokuste se nejprve vyhledat autora v historii (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Regio_glutealis&action=history) a kontaktovat jej. Podívejte se také do diskuse (https://www.wikiskripta.eu/w/Diskuse:Regio_glutealis).

Pokud vše nasvědčuje tomu, že původní autor nebude v editacích v nejbližší době pokračovat, odstraňte šablonu {{Pracuje se}} a stránku .

Stránka byla naposledy aktualizována v úterý 12. října 2021 v 11:34.

Regio glutealis sa nachází v rozsahu m. gluteus maximus a medius.

Ohraničenie

Mediální hranice: *gluteální rýha*

Distální hranice: *sulcus glutealis*

Proximální hranice: *crista iliaca*

Laterální hranice: *vertikála spuštěná ze spina iliaca anterior superior*

Reliéf je dán podkožním tukem a gluteálními svaly, pod kterými leží kyčelní kloub. Palpačně jsou přístupné spina iliaca anterior superior, spina iliaca posterior superior, trochanter major a tuber ischiadicum.

Kůže gluteální krajiny je silná, podložená silnou vrstvou podkožního tuku, zvláště u žen. Senzitivní inervaci zabezpečují **dorzální větve dolních lumbálních a horních sakrálních nervů a větve z n. cutaneus femoris posterior** (nn. clunium). Fascia glutea souvisí s vazivovými septy mezi snopci m. gluteus maximus. Při jeho předním okraji pokračuje na m. gluteus medius, kde je zesílená. Laterodistálně navazuje na tractus iliotibialis. Při trochanter major přechází do fascia lata femoris.

Snopce m. gluteus maximus směřují laterokaudálně a přechází do aponeurotické šlachy, která se upíná na trochanter major a do tractus iliotibialis. Mezi trochanter major a šlachou je uložena rozsáhlá *bursa trochanterica musculi glutei maximi*.

Další vrstvu tvoří m. gluteus medius, který překrývá m. gluteus minimus.

Kaudálně od m. gluteus medius leží m. piriformis a další pelvitrochanterické svaly. Průběhem m. piriformis je foramen ischiadicum majus rozděleno na **foramen suprapiriforme** (n. et vasa glutea superiora) a **infrapiriforme** (n. ischiadicus, mediálně od něj n. cutaneus femoris posterior a n. et vasa glutea inferiora).

Do foramen ischiadicum minus vstupuje po krátkém průběhu okolo spina ischiadica n. pudendus a vasa pudenda interna.

Klinická korelace

Do horného, vnějšího kvadrantu gluteální krajiny se aplikují **intramuskulární injekce**.