

Slizniční imunitní systém

Slizniční imunitní systém neboli **MALT** *mucosa associated lymphoid tissue* (v GIT označována *GALT* (gut), v dýchacích cestách *BALT* (bronchus)) je lymfatická tkáň ve slizničním nebo podslizničním vazivu.

- d-MALT – difusní lymfatická tkáň (buňky jsou rozptýleny ve sliznici nebo v submukose),
- o-MALT – organizovaná lymfatická tkáň (buňky jsou uspořádány do lymfatických folikulů, které mohou být samostatné (*folliculi lymphatici solitarii*) nebo sdružené do tzv. Peyerských plaků (*folliculi lymphatici aggregati*)).

Nad lymfatickými folikuly je střevní stěna kryta FAE (epithel asociovaný s folikuly), který obsahuje velké množství M-buněk (membránové buňky – ze střevního lumen endocytují antigeny a předávají jej lymfocytům).



Peyerské plaky v distálním úseku ilea, histologický preparát

Odkazy

Zdroj

- PASTOR, Jan. *Langenbeck's medical web page* [online]. [cit. 2009]. <<https://langenbeck.webs.com/>>.



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Slizni%C4%8Dn%C3%AD_imunitn%C3%AD_syst%C3%A9m&action=history) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.