

Subjektivní příznaky náhlých příhod břišních

- **Bolest** – nejčastější a nejdůležitější příznak NPB
 - viscerální;
 - kolika (ileus, ucpání žlučového, močových cest, torze ovarií, ...);
 - trvalá bolest (záněty);
 - somatická.
 - 🔍 *Podrobnější informace naleznete na stránce Druhy bolestí u NPB.*
- **Zvracení** – provází většinu NPB, ale někdy být nemusí
 - reflexní – nevede k úlevě po vyzvracení, je často na začátku NPB, vzniká drážděním peritonea;
 - z obstrukce trávicí trubice – vede k dočasné úlevě, vzniká z hromadění nadměrného obsahu;
 - centrální – vlivem vstřebaných toxinů na CNS.
- **Zástava odchodu plynů a stolice**
 - téměř u všech NPB;
 - vyskytuje se jako reflexní zástava u stavů, kdy dochází k dráždění peritonea, u ileu až po ochrnutí kliček (u vysokého ileu dochází k zástavě odchodu poměrně pozdě).
- **Škytavka**
 - vyskytuje se s odstupem 3–4 dnů od začátku NPB, má menší diagnostický význam;
 - vzniká drážděním peritonea v oblasti bránice nebo nahromaděním obsahu v hypochondriu.

Odkazy

Související články

- Objektivní příznaky náhlých příhod břišních



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Subjektivní příznaky náhlých příhod břišních](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Subjektivní_příznaky_náhlých_příhod_břišních)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.