

Tardieuovy skvrny



Tardieuovy skvrny jsou označovány tečkovité krevní výronky pod poplicnicemi a pohrudnicí u mechanického dušení. Je nutné zdůraznit, že tyto drobné petechie lze nalézt i pod epikardem (*ecchymoses subepicardiales*) a pod pouzdrém brzlíku (*ecchymoses subcapsulares thymi*), obecně pod serózními blanami.

Tyto ekchymózy nejsou výlučně patognomické pro mechanické formy dušení, ale jsou typickou součástí tzv. viscerálního syndromu městnání. V anglosaské soudnělékařské literatuře jsou velmi často Tardieuovy skvrny nesprávně ztotožňovány s vibices na kůži. Také syndrom týraného a zanedbávaného dítěte (CAN; battered child syndrom) bývá v literatuře označován jako (Ambroise) Tardieu syndrom.



Tardieuovy skvrny

Synonymem pro týž jev je název **Bayardovy skvrny** (Henri-Louis Bayard, 1812-1852, francouzský soudní lékař. Tečkovité krevní výronky pod poplicnicemi a pohrudnicí u dušení popsal u dušení dříve než Ambroise Tardieu). **Auguste Ambroise Tardieu** (1818-1879) - významný francouzský patolog a soudní lékař. Tečkovité krevní výronky pod poplicnicemi a pohrudnicí u dušení Tardieu systematicky popsal v roce 1859.

Odkaz

- NEČAS, Pavel, et al. Eponymické termíny v soudním lékařství. *Česko-Slovenská patologie a Soudní lékařství*. 2012, roč. 52, vol. 2, s. 25-30, ISSN 1210-7875.

Související články

- Udušení
- Udušení utopením
- Traumatická asfyxie
- Zasypaní