

Tiky

Tiky jsou rychlé, nepravidelně se opakující, stereotypní pohyby nebo vokalizace provázené uvolněním vnitřní tenze. Mívají nutkavý ráz, ale jsou částečně ovlivnitelné vůlí. Zmírňují se při soustředění na jinou činnost, zhoršují se při stresu a vzrušení. Oproti ostatním hyperkinetickým poruchám přetrvávají i ve spánku.^[1]

Rozdělení

- Pohybové x zvukové.
- Prosté x složité.
- **Prosté pohybové tiky** – klonické (např. krčení kořene nosu) či dystonické (např. otevírání a kroucení úst).
- **Složité pohybové tiky** (např. odhazování pramene vlasů z očí).
- **Prosté zvukové tiky** (např. odkašlávání).
- **Složité zvukové (vokální) tiky** (např. koprolálie, echolálie, palilálie).

Dle příčiny: idiopatické (Tourettův syndrom), symptomatické (sekundární).^[1]

Etiologie

Porucha funkce bazálních ganglií – přechodná zvýšená citlivost dopaminergních receptorů.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Tiky/PGS/diagnostika.*

Odkazy

Související články

- Extrapiramidové syndromy
- Hypokinetické extrapiramidové syndromy

Reference

1. NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, Evžen RŮŽIČKA a Jiří TICHÝ. *Neurologie*. 1. vydání. Praha : Galén, 2005. s. 30-35. ISBN 80-7262-160-2.