

Tinnitus/PGS (VPL)



Tento článek je určen pro postgraduální studium Všeobecného praktického lékařství

Článek je součástí vypracovávaných atestačních otázek, jejichž seznam můžete najít na portálu Všeobecného praktického lékařství.

Zařazení

Patří mezi **onemocnění vnitřního ucha**.

Dělení onemocnění vnitřního ucha:

- Kochleární nedoslýchavost;
 - náhlá porucha sluchu;
 - presbycusis;
 - poškození hlukem (akustické trauma);
 - **tinnitus** (ušní šelesty).
- Vestibulárního aparátu:
 - vestibulární neuropatie;
 - benigní paroxysmální polohová závrať;
 - Menierova nemoc.
- Záněty vnitřního ucha – labyrinthitida.
- Toxické poškození vnitřního ucha.
- Poranění vnitřního ucha:
 - commotio labyrinthi;
 - ruptura membrány okrouhlého okénka.

Klinický obraz

Klinický obraz je individuální a velice **variabilní**.

Tinnitus popisujeme

- **dle druhu** (jako šumění, syčení, bručení, praskání, pískání, zvonění),
- **dle trvání** (jako konstantní nebo záchvatovitý) a
- **dle charakteru** (jako rovnoměrný nebo pulsatorický).

Diagnostika


Po určení základní diagnózy tinitu odešleme ke specialistovi ORL.

Diferenciální diagnostika

- Sekreторická otitida.
- Náhlá porucha sluchu.
- Ménierova choroba.
- Neurinom akustiku – schwannom n.VIII.
- Vertebrokokchleární syndrom.
- Angiom.
- Anémie.

Terapie

- **Terapie dle základního onemocnění.**
- Při idiopatickém tinitu a terapeutické rezistenci ještě po 6 měsících od zahájení léčby indikujeme pacienta ke **kognitivně-behaviorální terapii**.
- Fytoterapie – preparáty **Ginkgo biloba**.



Odkazy

Související články

- Vertigo
- Vertigo/PGS/diagnostika
- Vertigo/PGS (VPL)
- Tinnitus
- Diferenciální diagnostika závratí a tinitu/PGS (VPL)

Použitá literatura

- GESENHUES, S a R ZIESCHÉ. *Vademecum lékaře : Všeobecné praktické lékařství*. 1. české vydání. Praha : Galén, 2006. ISBN 80-7262-444-X.