


Ubikvitinace

Procesy ubikvitinace

1. Ubikvitin je v buňce nejprve vázán (aktivován) za spotřeby ATP tzv. **ubikvitin-aktivujícím enzymem E1**.
2. Následně je přenesen na ubikvitin-přenašeč (nebo ubikvitin-konjugující) **enzym E2**.
3. Další přesun ubikvitinu na **protein, který má být degradován** (dále PDG; nebo na vytvářející se řetězec ubikvitinů na PDG) je podmíněn **ubikvitin-ligázou E3**, která dokáže specificky rozpoznat proteiny, jež mají být degradovány.



Ubikvitinace proteinů a jejich degradace proteazomem

Jinými slovy, enzymy E1 a E2 slouží převážně pouze k transportu ubikvitinů, naopak enzymy E3 obsluhují jejich konečné navázání na PDG, rozpoznány právě těmito enzymy. Nejprve je tedy na PDG navázán první ubikvitin, na něj pak druhý, na druhý třetí atd. Z toho, že E3 enzymy specificky rozpoznávají různé PDG, plyne také to, že v buňkách je málo různých E1 (podle ^[1] existují v lidských buňkách přinejmenším dva E1 enzymy, totiž Uba6 a Ube1) a E2 enzymů, zatímco E3 enzymů existuje rozmanité množství (stovky) pro různé skupiny proteinů, určených k degradaci.

Ubikvitin-ligázy

Rozeznáváme základní dva rody ubikvitin-ligáz, které se liší přítomností aktivní domény: buď obsahují **doménu HECT** (homologous to E6-Associated Protein C-Terminus), nebo **doménu RING** (really interesting new gene) ^{[2],[3]}. Navíc kromě klasické kaskády E1-E2-E3 dnes už známe také tzv. E4 enzymy, které se mohou podílet na prodlužování polyubikvitinového řetězce^[4].

Způsob vazby ubikvitinů

Klíčovou otázkou je také to, jakým způsobem jsou ubikvitiny v řetězci navzájem spojeny. Nikoli každý polyubikvitinový řetězec je totiž *prima facie* polibkem smrti. Nejběžnější způsob vazby dvou ubikvitinů v polyubikvitinovém řetězci je přes **lysín 48** (tzv. K48 řetězce) nebo **lysín 63** (tzv. K63 řetězce), existují však i řetězce ubikvitinů vázané přes lysín 6, 11, 27, 29 či 33, výjimečně bývají tyto řetězce i rozvětvené^[5]. Dnes neumíme přesně říci, jaký je význam celé pestrosti těchto signálů. Za „polibek smrti“ jsou považovány zejména K48 řetězce, zatímco K63 řetězce hrají především jiné role v buněčné signalizaci. Nedávno se však ukázalo, že také proteiny označené K63 řetězci mohou být rozpoznány proteazomy a degradovány v nich^[6]. Existuje dokonce možnost, že K63 řetězce mohou být přeměněny přímo na označeném proteinu na K48 řetězce^[7].

Odkazy

Související články

- Bílkoviny
- Degradace proteinů
- Deubikvitinace
- Historie ubikvitin-proteazomového systému
- Proteazom
- Inhibitory proteazomu
- Translace

Externí odkazy

- Ubikvitinace (česká wikipedia)
- Posttranslational modification (anglická wikipedia)

► Ubiquitin Proteasome System (<https://www.youtube.com/watch?v=hvNJ3yWZQbE>) – YouTube video vysvětlení (anglicky)

Zdroj

- CVEK, Boris. Od ubikvitinu k antabusu. *Britské listy : deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví* [online]. 2011, roč. -, s. -, dostupné také z <<https://blisty.ca> externích linků (již nefunkční stránka)>. ISSN 1213-1792.

Reference

1. JIN, Jianping, Xue LI a Steven P GYGI, et al. Dual E1 activation systems for ubiquitin differentially regulate E2

- enzyme charging. *Nature* [online]. 2007, vol. 447, no. 7148, s. 1135-8, dostupné také z <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17597759>>. ISSN 0028-0836 (print), 1476-4687.
2. ROTIN, Daniela a Sharad KUMAR. Physiological functions of the HECT family of ubiquitin ligases. *Nat Rev Mol Cell Biol* [online]. 2009, vol. 10, no. 6, s. 398-409, dostupné také z <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19436320>>. ISSN 1471-0072 (print), 1471-0080.
 3. DESHAIES, Raymond J a Claudio A P JOAZEIRO. RING domain E3 ubiquitin ligases. *Annu Rev Biochem* [online]. 2009, vol. 78, s. 399-434, dostupné také z <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19489725>>. ISSN 0066-4154 (print), 1545-4509.
 4. HOPPE, Thorsten. Multiubiquitylation by E4 enzymes: 'one size' doesn't fit all. *Trends Biochem Sci* [online]. 2005, vol. 30, no. 4, s. 183-7, dostupné také z <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15817394>>. ISSN 0968-0004.
 5. IKEDA, Fumiyo a Ivan DIKIC. Atypical ubiquitin chains: new molecular signals. 'Protein Modifications: Beyond the Usual Suspects' review series. *EMBO Rep* [online]. 2008, vol. 9, no. 6, s. 536-42, dostupné také z <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2427391/?tool=pubmed>>. ISSN 1469-221X (print), 1469-3178.
 6. SAEKI, Yasushi, Tai KUDO a Takayuki SONE, et al. Lysine 63-linked polyubiquitin chain may serve as a targeting signal for the 26S proteasome. *EMBO J* [online]. 2009, vol. 28, no. 4, s. 359-71, dostupné také z <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2646160/?tool=pubmed>>. ISSN 0261-4189 (print), 1460-2075.
 7. NEWTON, Kim, Marissa L MATSUMOTO a Ingrid E WERTZ, et al. Ubiquitin chain editing revealed by polyubiquitin linkage-specific antibodies. *Cell* [online]. 2008, vol. 134, no. 4, s. 668-78, dostupné také z <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18724939>>. ISSN 0092-8674 (print), 1097-4172.