

Wellsovo skóre



Wellsův skórovací systém (Wellsovo skóre), či jeho zjednodušená verze, se využívají k určení pravděpodobnosti plicní embolie. Určení míry rizika je založeno na anamnestických datech a klinickém vyšetření.

klinické podezření na hlubokou žilní trombózu	3 body
jiná diagnóza je méně pravděpodobná než plicní embolie	3 body
tachykardie > 100/min	1,5 bodu
imobilizace/chirurgický zákrok v předchozích 4 týdnech	1,5 bodu
anamnéza předchozí hluboké žilní trombózy nebo plicní embolie	1,5 bodu
hemoptýza	1 bod
aktivní nádorové onemocnění (aktuálně léčené či v předchozích 6 měsících)	1 bod

Riziko plicní embolie

pravděpodobnost	skóre
nízká	0–1 bodů
střední	2–6 bodů
vysoká	více či rovno 7 bodů

Odkazy

Související články

- Plicní embolie
- Plicní embolie (EKG)
- Embolie
- Hluboká žilní trombóza
- Tromboembolická nemoc

Použitá literatura

- Skórovací systémy u tromboembolické nemoci (<https://www.kardiologickarevue.cz/casopisy/kardiologicka-revue/2015-2/skorovaci-systemy-u-tromboembolicke-nemoci-52101>)
- MDCalc (<https://www.mdcalc.com/calc/115/wells-criteria-pulmonary-embolism#evidence>)