

Známky peritoneálního dráždění

Mezi známky peritoneálního dráždění řadíme:

1. **Défense musculaire** – reflexní kontrakce svalů břišní stěny, jejímž cílem je zabránit šíření zánětu.
2. **Pleniésovo znamení** – poklepová bolestivost břicha.
3. **Blumbergovo znamení** – stlačíme břišní stěnu v místě předpokládaného zánětu, následným rychlým uvolněním stlačení vyvoláme v místě zánětu bolest.
4. **Rovsingovo znamení** – palpací břišní stěny na protilehlé straně vyvoláme bolest v místě zánětu.
5. **Murphyho příznak** – zmáčknutí pravého podžebří s bolestí.

Odkazy

Související články

- Defense musculaire
- Diferenciální diagnóza zánětlivých a ileózních NPB
- Diferenciální diagnostika ileózních stavů
- Náhlé příhody břišní u dětí
- Objektívni příznaky náhlých příhod břišních
- Subjektívni příznaky náhlých příhod břišních

Použitá literatura

- ZEMAN, Miroslav, et al. *Chirurgická propedeutika*. 2. vydání. Praha : Grada, 2000. 524 s. s. 138-139. ISBN 80-7169-705-2.
- ZEMAN, Miroslav, et al. *Speciální chirurgie*. 2. vydání. Praha : Galén, 2006. 575 s. s. 326. ISBN 80-7262-260-9.



Palpační vyšetření břicha

Článek neobsahuje vše, co by měl.



Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Zn%C3%A1mk%C3%BDy_peritone%C3%A1ln%C3%ADho_dr%C3%A1%C5%BEd%C4%9Bn%C3%AD&action=history) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.