

## Vídeňská klasifikace gastrointestinálních epiteliálních neoplazií (2002)

<i>Kategorie</i>	<i>Diagnóza</i>	<i>Klinický management</i>
1	negativní nález	volitelně sledování
2	neurčitý nález	sledování
3	slizniční low-grade neoplazie	endoskopická resekce nebo sledování
	low-grade adenom	
	low-grade dysplazie	
4	slizniční high-grade neoplazie	endoskopická nebo lokální chirurgická resekce
4.1	high-grade adenom/dysplazie	
4.2	neinvazivní karcinom (karcinom <i>in situ</i> )	
4.3	podezření na invazivní karcinom	
4.4	intramukózní karcinom	
5	karcinom se submukózní invazí	chirurgická resekce

### Komentáře

1. Původní klasifikace(1) řadila řadila kategorii 4.4 jako kategorii 5.1, stávající kategorie 5 byla kategorií 5.2.
2. Volba konkrétního terapeutického postupu od kategorie 3 výše se odvíjí od velikosti léze, hloubky invaze stanovené endoskopicky, radiologicky nebo ultrasonograficky a dále od věku a případných komorbidit pacienta. Zohledněny jsou i další charakteristiky karcinomu, např. hloubka invaze nebo invaze do lymfatických cév.(2)

### Literatura

1. Schlemper R.J. et al.: The Vienna classification of gastrointestinal epithelial neoplasia. *Gut* 2000;**47**:251-255
2. Dixon M.F.: Gastrointestinal epithelial neoplasia: Vienna revisited. *Gut* 2002;**51**:130-131