

GASTROINTESTINÁLNÍ STROMÁLNÍ TUMORY - RIZIKO PROGRESE A STAGING

Riziko progresu v závislosti na velikosti a mitotické aktivitě. (Miettinen a Lassota, 2006)					
velikost	mitotická aktivita	žaludek	jejunum a ileum	duodenum	rektum
pod 2 cm	nízká	žádné	žádné	žádné	žádné
2-5 cm	nízká	velmi malé	malé	malé	malé
5-10 cm	nízká	malé	vysoké	vysoké	vysoké
nad 10 cm	nízká	střední	vysoké	vysoké	vysoké
pod 2 cm	vysoká	–	–	–	vysoké
2-5 cm	vysoká	střední	vysoké	vysoké	vysoké
5-10 cm	vysoká	vysoké	vysoké	vysoké	vysoké
nad 10 cm	vysoká	vysoké	vysoké	vysoké	vysoké

TNM staging. (AJCC: Cancer Staging Manual, 7. vyd., 2010)			
TX	nebyl hodnocen	N0	regionální LU nejsou postiženy
T0	neprokázán	N1	regionální LU jsou postiženy
T1	nejvýše 2 cm v průměru		
T2	2-5 cm v průměru		
T3	5-10 cm v průměru	M0	vzdálené metastázy nejsou
T4	více než 10 cm v průměru	M1	vzdálené metastázy jsou

Klinické stádium podle TNM. (AJCC: Cancer Staging Manual, 7. vyd., 2010)									
žaludek, omentum					tenké střevo, jícen, kolorektum, mesenterium, peritoneum				
stádium	T	N	M	mitotický index	stádium	T	N	M	mitotický index
IA	1	0	0	nízký	I	1	0	0	nízký
IA	2	0	0	nízký	I	2	0	0	nízký
IB	3	0	0	nízký	II	3	0	0	nízký
II	1	0	0	vysoký	IIIA	1	0	0	vysoký
II	2	0	0	nízký	IIIA	4	0	0	nízký
II	3	0	0	nízký	IIIB	2	0	0	vysoký
IIIA	3	0	0	vysoký	IIIB	3	0	0	vysoký
IIIB	4	0	0	vysoký	IIIB	4	0	0	vysoký
IV	–	1	0	–	IV	–	1	0	–
IV	–	–	1	–	IV	–	–	1	–