

Alergické kožní projevy

Mezi **alergické kožní projevy** patří: kopřivky vyvolané imunologickými mechanizmy a angioedém, alergické kontaktní dermatitidy a atopická dermatitida.

Kopřivky vyvolané imunologickými mechanizmy

- Anafylaktický typ přecitlivělosti (IgE zprostředkovaná alergie; I. typu) - krátkodobá akutní reakce na potraviny, léky nebo kontaktní alergen.
- Imunokomplexový typ přecitlivělosti (non-IgE zprostředkovaná alergie; III. typu) - reakce typu sérové nemoci po léčbě penicilinem nebo po aplikaci cizorodých orgánových extraktů obsahujících proteiny (cizorodá séra, hormony) a urtikariální vaskulitidy.
- Autoimunitní mechanizmy (II. typu; autoprotilátky zejména třídy IgG1 a IgG3 proti receptoru FcεRIα mastocytů, popř. proti imunoglobulinům IgE) - chronická kopřivka, někdy v asociaci s autoimunitním onemocněním štítné žlázy, dermatomyozitidou či SLE.^[1]

Angioedém

- Deficit v komplementovém systému (inhibitoru C1 složky komplementu) - angioedém (hereditární, získaný i vzniklý jako nežádoucí účinek léků ze skupiny ACE inhibitorů).^[1]

Alergická kontaktní dermatitida

- svědivá ekzematózní ložiska v místech kontaktu s alergenem (nikl a další kovy, lokální léčiva, parfemace, konzervační látky a pryž - thiomersal)
- opožděný typ hypersenzitivní reakce (IV. typu), zprostředkovaný haptenspecifickými T buňkami
- diagnostika - epikutánní testy.^[1]

Atopický ekzém

- chronické, recidivující, svědivé kožní onemocnění.

Odkazy

Související články

- Alergie

Externí odkazy

Použitá literatura

Reference

1. VIKTORINOVÁ, M. Kopřivky vyvolané imunologickými mechanizmy. *Dermatologie pro praxi* [online]. 2008, roč. 2, vol. 5-6, s. 218-222, dostupné také z <<https://www.dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2008/05/02.pdf>>.



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům (https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Alergick%C3%A9_ko%C5%BEn%C3%AD_projevy&action=history) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.