

Aspirační pneumopatie (neonatologie)

Mezi aspirační pneumopatie novorozenců patří:

- Syndrom aspirace mekonia;
 - komplexní respirační onemocnění novorozence vzniklé časně po porodu na podkladě průniku částic mekonia (smolky) do dolních cest dýchacích;^[1]
- Aspirace krve při porodu císařským řezem nebo při vaginálním porodu s abrupcí placenty → časně nastupující dechová tíseň novorozence;
- Aspirace vody během porodu do vody;
- Aspirace při dyskoordinaci sání/polykání
 - rizikové faktory: nezralost, strukturální malformace, neurologické odchylky, rozštěp patra, syndrom Pierre Robin, tracheoezofageální píštěl, rozštěp laryngu, hypoxicko-ischemická encefalopatie, Praderův-Williho syndrom, ...
- Aspirace na podkladě gastro-ezofageálního refluxu, masivní regurgitace a vdechnutí stravy.^[2]

Odkazy

Související články

- Syndrom aspirace mekonia • Aspirační pneumonie

Externí odkazy

Reference

1. JANOTA, Jan a Zbyněk STRAŇÁK. *Neonatologie*. 1. vydání. Praha : Mladá fronta, 2013. s. 427. ISBN 978-80-204-2994-0.
2. RENNIE, JM, et al. *Textbook of Neonatology*. 5. vydání. Churchill Livingstone Elsevier, 2012. s. 507. ISBN 978-0-7020-3479-4.



Článek neobsahuje vše, co by měl.

Můžete se přidat k jeho autorům ([https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Aspira%C4%8Dn%C3%AD_pneumopatie_\(neonatologie\)&action=history](https://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Aspira%C4%8Dn%C3%AD_pneumopatie_(neonatologie)&action=history)) a jej.

O vhodných změnách se lze poradit v diskusi.