

# Candidosis

**Kandidóza** je častá infekce vyvolaná kvasinkami rodu *Candida*. Postihuje především intertriginózní lokalizace kůže a sliznice.<sup>[1]</sup>

*Candida* spp. patří mezi nozoparazitární houby, tj. které žijí jako **saprofyté** na kůži, v dutině ústní, ve vagíně či ve střevě člověka. Za určitých podmínek se pomnoží a vyvolávají pak chorobné stavy. Mezi tyto podmínky patří: teplo, vlhko, macerace, porušení kožního povrchu, změny pH (zejména alkalizace), obezita, gravidita, diabetes mellitus, kachektizující nemoci, antibiotika, kortikoidy či imunodeficity.

## Soor (moučnivka, orální kandidóza)

Bílé povlaky na sliznici jazyka, tváří nebo patra, může se šířit až do hltanu, výjimečně i do žaludku. Původně bílá barva se mění přes žlutou k hnědé barvě. Povlaky lze zpočátku setřít, později pevně adherují ke spodině. Sliznice v okolí sytě červená, obvykle se šíří do koutků.

Výskyt u dětí do dvou let, u imunodeficitních, u léčených širokospektrálními antibiotiky.

## *Anguli infectiosi*

Nejčastěji způsobeno kandidami. Spolupůsobící faktory: hluboký skus, diabetes mellitus, ariboflavinóza, GIT poruchy a další. Diferenciálně diagnosticky rozlišujeme: kokové koutky, syfilis, herpes simplex.

Léčba: nystatin , borax-glycerin povrchově, amfotericin B , ketokonazol .

## *Vulvovaginitis candidosa*

U starších žen. Zarudlá sliznice, otok vulvy, silné svědění, bělavé povlaky a výtok, infekce z konečníku.

 *Podrobnější informace naleznete na stránce Vulvovaginitis candidomyceta.*

## *Balanitis candidosa*

Rovněž častěji u diabetiků. Červené, erodované, ostře ohraničené svědicí ložisko, bělavé povlaky.

## *Candidosis intertriginosa*

Nejčastěji v genitokrurálních rýhách, v řasách břicha a pod prsy. Projevy svědění a pálení, plochy zarudlé, ostře ohraničené, v okolí výsev svědicích puchýřků.

## *Erosio interdigitalis candidosa (blastomycetica)*

Profesionální onemocnění kuchařek, pekařů a cukrářů. Hlavně mezi **3. a 4.** prstem na rukou. Rudá, svědicí eroze nebo ragáda, bělavá, macerovaná epidermis kolem. Ke vzniku přispívá macerace a cukr.

## *Paronychia candidosa*

Také profesionálně jako předchozí. Chronické zánětlivé zduření a zarudnutí valu, ze kterého lze vytlačit kapku bělavého exsudátu.



Orální kandidóza (soor)




Kandidová infekce jazyka



Orální kandidóza (soor)




Kandidové paronychium



Candida albicans

## Video



Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.

## Odkazy

### Související články

- Vulvovaginitis candidomyceta
- Mykóza
- Onychomykóza
- Mykotická onemocnění v novorozeneckém věku

### Externí odkazy

- wikipedia:en:Candidiasis
- <https://www.cdc.gov/fungal/diseases/candidiasis/>

### Zdroj

- BENEŠ, Jiří. *Studijní materiály* [online]. ©2007. [cit. 2015-03-24]. <<http://www.jirben2.chytrak.cz/materialy/dermatovenerologie.doc>>.

### Reference

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 2. vydání. Praha : Galén, 2013. 502 s. ISBN 978-80-7262-898-8.

### Použitá literatura

- ŠTORK, Jiří, et al. *Dermatovenerologie*. 2. vydání. Praha : Galén, 2013. 502 s. ISBN 978-80-7262-898-8.
- LOBOVSKÁ, Alena. *Infekční nemoci*. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 263 s. ISBN 80-246-0116-8.
- HAVLÍK, Jiří, et al. *Infektologie*. 2. vydání. Praha : Avicenum, 1990. 393 s. ISBN 80-201-0062-8.