

Difúzní alveolární hemoragie

Difúzní alveolární hemoragie (DAH) je život ohrožující akutní projev systémových onemocnění pojiva, nejčastěji systémových vaskulitid či SLE.

Klinický obraz

Obraz progredujícího respirační a ledvinné selhání.

- hypoxémie
- hemoptýza
- akutní anemizace (krevní ztráta)

Diagnóza

- akutní bronchoskopie s bronchoalveolární laváží
- **Zobrazujících vyšetřeních:** bývá přítomna bilaterální plicní infiltrace
- **KO:** rychlá anemizace
- u většiny nemocných pozitivita ANCA protilátek

Terapie

Pokud není včas zahájena terapie hrozí MOF.

1. ventilace

- zavedení arteficiální ventilace, ECMO

2. farmakoterapie - imunomodulace

- pulzy kortikosteroidů
- cyklofosfamid a rituximab

3. eliminaniční léčba

- Plazmaferéza
- Indikace: rychle progredující renální selhání, ↓ cirkulujících protilátek

Zdroj

Bradna P, Maňák J, Soukup T, Kodeda M, Drahošová M, Tomš J. Difúzní alveolární hemoragie - akutní, život ohrožující stav v revmatologii. Vnitr Lek. 2018;64(2):169-172. doi: 10.36290/vnl.2018.025.